

Zielgruppenbezogene inhaltliche Beratungshilfen für Frauen

Wir bieten Beratung und Untersuchung zu HIV und folgenden STD an: Syphilis, Hep B, Hep C, Gonorrhoe, Chlamydien, Pilzinfektionen/Trichomonaden, HPV, HSV				
	Beratung		Untersuchung	
	immer (*)	nach Risiko	immer (**)	nach Risiko
Sexarbeiterinnen	Syphilis Hep B Go Chlamydien HPV	HIV + alle anderen	Syphilis Hep B Go Chlamydien HPV	HIV + alle anderen
Frauen mit i.v. Drogenkonsum	HIV Hep B Hep C	alle anderen	HIV Hep B Hep C	alle anderen
Frauen mit hw hetersex. Kontakten	Hep B Chlamydien HPV (in bes. Lebenslagen)	HIV + alle anderen	Hep B Chlamydien HPV (in bes. Lebenslagen)	HIV + alle anderen
Frauen aus Endemiegebieten	HIV Syphilis (Osteuropa) Hep B Chlamydien	alle anderen	HIV	alle anderen
Frauen mit 'Bilanz' oder Einzelrisiko	Chlamydien (neue Bez.) HPV (neue Bez.)	HIV alle anderen	Chlamydien (neue Bez.) HPV (neue Bez.)	HIV + alle anderen
Frauen 16 - 25 Jahre	Chlamydien HPV	HIV alle anderen	Chlamydien	HIV + alle anderen

\*) incl. Hinweis auf Hep B- sowie HPV-Impfung u. gegebenenfalls Krebsvorsorge  
 \*\*) wenn Abstrichuntersuchungen, dann immer auch Nativabstrich und klin. Inspektion

**Mögliche Risiken können sein:**

- o Häufigkeit der Sexualkontakte (eigene Person und/oder Partner/in)
- o Anzahl und bekannte Risiken der Sexualpartner/innen
- o Benutzung von Schutzmitteln (eigene Person und/oder Partner/in)
- o Partner/in HIV/STD-positiv
- o Anamnese bereits durchgemachter STD

**in Verbindung mit:**

1. spezif. Sexpraktiken (u.a. blutiger Sex, Periodenblut)
2. Ausbreitung der spezifischen Infektionen in der Bevölkerungsgruppe

**Untersuchungsverfahren:**

Serologie:		Abstrichuntersuchungen:	
Syphilis	TPHA, CBR	Gonorrhoe	PCR
	Westernblot IgM, ggfs. IgG	Chlamydien	PCR
Hep B	Anti HBc, HBs AG	HPV	Zytologie, ggfs. HPV-Typisierung
Hep C	Anti HCV	Pilzinfekt./ Trichom. u.ä.	Mikroskopie vor Ort

Zielgruppenbezogene inhaltliche Beratungshilfen für Männer



Wir bieten Beratung und Untersuchung zu HIV und folgenden STD an: Syphilis, Hep B, Hep C, Gonorrhoe, Chlamydien, Pilzinfektionen/Trichomonaden, HPV, HSV				
	Beratung		Untersuchung	
	immer *)	nach Risiko	immer **)	nach Risiko
MSM	HIV	alle anderen	HIV	alle anderen
	Syphilis		Syphilis	
	Hep B		Hep B	
Sexarbeiter	HIV	alle anderen	HIV	alle anderen
	Syphilis		Syphilis	
	Hep B		Hep B	
	Go		Go	
	Chlamydien		Chlamydien	
Männer mit i.v. Drogenkonsum	HIV	alle anderen	HIV	alle anderen
	Hep B		Hep B	
	Hep C		Hep C	
Männer mit hw hetersex. Kontakten und Freier	Syphilis	HIV +	./.	HIV +
	Hep B	alle anderen		alle anderen
	Go			
	Chlamydien			
Männer mit 'Bilanz' oder Einzelrisiko	Chlamydien (neue Bez.)	HIV + alle anderen	./:	HIV + alle anderen
Männer aus Endemiegebieten	HIV	alle anderen	HIV	alle anderen
	Syphilis			
	Hep B			

\*) incl. Hinweis auf Hep B-Impfung

\*\*\*) wenn Abstrichuntersuchungen, dann immer klin. Inspektion

**Mögliche Risiken können sein:**

- o Häufigkeit der Sexualkontakte (eigene Person und/oder Partner/in)
- o Anzahl und bekannte Risiken der Sexualpartner/innen
- o Benutzung von Schutzmitteln (eigene Person und/oder Partner/in)
- o Partner/in HIV/STD-positiv
- o Anamnese bereits durchgemachter STD

**in Verbindung mit:**

1. spezif. Sexpaktiken (u.a. blutiger Sex, Periodenblut)
2. Ausbreitung der spezifischen Infektionen in der Bevölkerungsgruppe

**Untersuchungsverfahren:**

Serologie:		Abstrichuntersuchungen:	
Syphilis	TPHA, CBR	Gonorrhoe	PCR
	Westernblot IgM, ggfs. IgG	Chlamydien	PCR
Hep B	Anti HBc, HBs AG	HPV	Zytologie, ggfs. HPV-Typisierung
Hep C	Anti HCV	Pilzinfekt./ Trichom. u.ä.	Mikroskopie vor Ort